L2S4 - Calcul matriciel

Correction des exercices 7, 8, 9, 10, 11 et 12

qkzk

2021/01/30

Correction Exercice 7

Il faut vérifier que (AB)C = A(BC).

Il suffit de poser les calculs et on trouve les résultats suivants :

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$
$$(AB)C = \begin{pmatrix} 4 & -12 \end{pmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{pmatrix} 4 & -12 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$BC = \begin{pmatrix} -2 & 3\\ 3 & -5\\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{pmatrix} 4 & -12 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Exercice 8

Déterminer toutes les matrices X de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant :

1.
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{1.} \ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On pose
$$X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{array}\right] \left[\begin{array}{cc} x & y \\ z & t \end{array}\right] = \left[\begin{array}{cc} z & t \\ 2z & 2t \end{array}\right]$$

Donc
$$\begin{bmatrix} z & t \\ 2z & 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow z = t = 0$$

et
$$X = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

On a l'exemple de deux matrices non nulles dont le produit vaut 0. On dit que ces matrices divisent zéro.

1

2.
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+z & y+t \\ z & t \end{bmatrix}$$

$$\text{Donc } \begin{bmatrix} x+z & y+t \\ z & t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{et } \begin{cases} x+z=1 \\ y+t=0 \\ z=0 \\ t=1 \end{cases} \text{ donc } \begin{cases} x=1 \\ y=-1 \\ z=0 \\ t=1 \end{cases} \text{ et } X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dans le second cas, X est en fait *l'inverse* de $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Exercice 9

Résoudre dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ le système :

$$\begin{cases} X+Y &= \begin{pmatrix} -3 & 1\\ -1 & 3 \end{pmatrix} \\ X+2Y &= \begin{pmatrix} 6 & 4\\ 5 & 3 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Correction Exercice 9

Notons A et B les deux matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ des seconds membres.

On cherche alors à résoudre le système :

$$(S) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} X+Y & = & A \\ X+2Y & = & B \end{array} \right.$$

$$(S) \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{lcl} Y & = & B-A \\ X & = & A-Y = 2A-B \end{array} \right.$$

Il vient donc
$$Y=\left[\begin{array}{cc} 9 & 3 \\ 6 & 0 \end{array}\right]$$
 et $X=\left[\begin{array}{cc} -12 & -2 \\ -7 & 3 \end{array}\right]$

Exercice 10

On considère
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
 et $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

- 1. Calculer $AB, BA, (A+B)^2$ et $A^2+2AB+B^2$. Que remarquez-vous ? 2. Calculer ${}^t(AB)$ et ${}^tA\cdot {}^tB$

Correction Exercice 10

1. Calculer $AB, BA, (A+B)^2$ et $A^2 + 2AB + B^2$. Que remarquez-vous ?

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -7 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \ B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \ A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -4 \\ 3 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \ (A + B)^2 = \begin{pmatrix} 6 & 0 & -4 \\ 12 & 1 & 4 \\ -6 & 0 & 10 \end{pmatrix}, \ A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & -4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \ B^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \\ -8 & -5 & 6 \end{pmatrix}, \ A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 9 & 3 & -8 \\ -20 & -3 & 7 \\ -9 & -6 & 11 \end{pmatrix}$$

 $AB \neq BA \Rightarrow$ pas d'identité remarquable ou de binôme de Newton.

2. Calculer ${}^{t}(AB)$ et ${}^{t}A \cdot {}^{t}B$

$${}^{t}A = \begin{pmatrix} 3 & 11 & -1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -2 & -8 & 1 \end{pmatrix}, {}^{t}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}, {}^{t}(A \cdot B) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}, {}^{t}A \cdot {}^{t}B \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On a toujours ${}^t(A\cdot B)=^tB\cdot {}^tA$ mais on s'arrête là car $AB\neq BA$

Exercice 11

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Déterminer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Correction exercice 11

Déterminer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Et, pour tout $n \ge 4$, $A^n = A^4 \cdot A^{n-4} = O_3 \cdot A^{n-4} = O_4$

Comme $n \ge 4, n-4 \ge 0$ et A^{n-4} est bien définie.

Remarques

Une matrice carrée $N \neq O$ telle que $N^p = O$ pour $p \in \mathbb{N}^*$ est dite nilpotente. C'est le cas de toute matrice triangulaire dont les coefficients diagonaux sont nuls.

3

Remarquons donc qu'on peut diviser zéro chez les matrices carrées...

Exercice 12

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ -1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

- 1. Calculer A^2
- 2. Déterminer la matrice B telle que $A^2 = A + B$
- 3. a) Démontrer que AB = B
 - b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a $A^n = A + (n-1)B$

Correction Exercice 12

1. Calculer A^2

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 2 & 5 & 6 \\ -2 & -4 & -5 \end{pmatrix}$$

2. Déterminer la matrice B telle que $A^2=A+B$

$$A^2 = A \cdot B \Leftrightarrow B = A^2 - A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

3. a) Démontrer que AB = B

On calcule AB et il vient B.

3. b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*$ on a $A^n = A + (n-1)B$

Nous allons faire un raisonnement par récurrence pour $n \in \mathbb{N}^*$

- 1. La propriété est vraie au rang n = 1: A + 0B = A.
- 2. Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^n = A + (n-1)B$ Alors, $A^{n+1} = A \cdot A^n = A(A+(n-1)B) = A^2 + (n-1)AB = A+B+(n-1)B = A+nB$ La propriété est donc vraie au rang n+1
- 3. D'après le principe de récurrence elle est vraie à tous les rangs $n \ge 1$.